



TRÉBOL ROSADO

(*Trifolium pratense*)

Es una leguminosa botánicamente perenne, sin embargo la presión de algunas plagas y enfermedades limita su persistencia a dos o tres años.

Su principal característica es el rápido establecimiento, crecimiento erecto y buena recuperación al corte o talaje. De esta manera se asocia muy bien a ballicas bianuales y festuloliums tipo ballica italiana.

En praderas entre la Séptima y Octava Región es una excelente alternativa como forraje de verano, ya que sus mayores tasas de crecimiento las logra a fines de primavera e inicios de verano.

Presenta una buena relación hoja/tallo, lo que se relaciona con una muy buena calidad nutricional permitiendo ser utilizado en sistemas de pastoreo intenso y sistemas de conservación de forraje.

Las variedades que SG-2000 comercializa, son de genética nacional.

QUIÑEQUELI

Variedad desarrollada por INIA a inicio de los años '60. Ampliamente evaluada en diversas zonas del país y en el extranjero. De buen rendimiento aunque susceptible a plagas y enfermedades que limitan su persistencia.

REDQUELI

Variedad nueva desarrollada por INIA, más productiva y resistente a enfermedades foliares que Quiñequeli, asegurando una mejor persistencia y rendimiento.

Producción de forraje y resistencia a oidio, evaluado durante tres temporadas en cuatro localidades (Santiago, Chillán, Temuco y Osorno).

	Quiñequeli	Redqueli
Producción de forraje promedio (suma de tres temporadas; t MS/ha)	27,5	29,8
Severidad de ataque de oidio y rango (% follaje afectado)	34,8 (16 – 50)	6,2 (1 – 15)

Fuente: Adaptado de INIA, 2003.

SG
2000
M.R.
Expertos en semillas

Ficha técnica:

Persistencia: **2 a 3 años**

Tamaño de hoja: **Grande**

Dosis de siembra: **8 a 12 kg/ha.**

Alternativas de mezclas:

- Para el valle central de la Séptima a la Octava Región, se recomienda asociar 10 kg/ha de trébol rosado con 25 kg/ha de Festulolium Perún.

Trébol v/s Gramínea

Distribución de la producción

